



REINIGUNGS-/ DESINFEKTIONSPLAN

HAUTSCHUTZPLAN

Klinik:	HolsingVital Bad Holzhausen		Abteilung: Bäderabteilung			
Gegenstand/Maßnahme		Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit	Ausführung
	Hygienische Händedesinfektion	Skinman Soft Protect FF	gebr.-fertig	30 sek.	▪ VOR: Patientenkontakt, aseptischen Tätigkeiten ▪ NACH: Kontakt mit potentiell infektiösem Material, Patientenkontakt, Kontakt mit der unmittelbaren Patienten Umgebung	Etwa 3–5 ml Desinfektionslösung, bzw. eine Menge, die in eine Hohlhand passt Händedesinfektionsmittel aus dem Spender in die trockenen Hände geben und gleichmäßig bis zu den Handgelenken einreiben. Fingerzwischenräume und Nagelfalz beachten. Gemäß TRBA 250 und RKI ist das Tragen von Schmuck an Händen und Unterarmen nicht gestattet Merke: · Kein Wasser zugeben! · Einwirkzeit beachten!
	Händewaschung	Manisoft	gebr.-fertig	-	▪vor Dienstbeginn ▪nach Kontakt mit Sporen ▪nach Toilettengang ▪bei Verschmutzung/ Bedarf	Waschlotion in die angefeuchteten Hände geben, gut mechanisch reinigen. Mit Wasser gründlich abspülen. Anschl. mit Einmal-Handtuch trocknen.
	Hautschutz	LINDESA Professional	gebr.-fertig	-	vor Dienstbeginn nach Pausen vor Feuchtarbeiten	Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).
	Hautpflege	LINDESA Professional	gebr.-fertig	-	nach Arbeitsende, ggf. nach Hautreinigung vor Pausen	Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).
	Einmalhandschuhe				Anlegen: -bei Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien -bei der Verwendung von Flächendesinfektionsmitteln usw.	- Vor dem Anlegen und NACH dem Ablegen der Einmalhandschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen. - Passende Größe auswählen - Nach Benutzung entsorgen
	Spender	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	bei Flaschenwechsel bei Bedarf	Jeweils neue Behälter für Waschlotion und Händedesinfektionsmittel verwenden. Wischdesinfektion durchführen. Düse mit heißem Wasser durchspülen.
	Behandlungsliege, Massageliege, Lagerungshilfsmittel	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	Nach Patientenwechsel, nach Benutzung und bei Bedarf + Kontamination	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Handtücher Decken	-	-	-	nach jeder Anwendung	Die Handtücher werden patientenbezogen benutzt. Bei Bedarf und nach Entlassung erfolgt ein desinfizierendes und thermisches Waschverfahren.
	Nacken-, Knierolle, Kissen	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	nach Kontakt mit der Haut 1 x monatlich	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Flächendesinfektion der Arbeitsflächen	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	Nach Kontamination	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
		Adenovirus	2,0 %	60 Min.	täglicher Unterhaltsreinigung und bei Bedarf	
	Vliestuchspendersysteme	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	nach 28 Tagen Standzeit oder bei Bedarf	Aufbereitung nach Herstellerangaben
	Berufskleidung	-	-	-	Wechsel arbeitstäglich bei Kontamination bei Bedarf	Maschinelle Aufbereitung; desinfizierendes/thermisches Waschverfahren. Keine Privatkleidung (Strickjacken/ langärmelige Kleidung) über und unter der Dienstkleidung tragen. Die Kleidung darf nur zentral aufbereitet werden - nicht zuhause waschen!
	Alkohol-empfindliche Geräte	Incidin Oxy Wipe	gebr.-fertig	15 Min.	Nach Benutzung bei Bedarf sichtbarer Kontamination	Alkoholfreie Desinfektion empfindlicher Oberflächen. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen. Halbbarkeit nach Anbruch: 3 Monate
	Alkohol-unempfindliche Geräte	Incidin Alcohol Wipe	gebr.-fertig	15 Min.	Nach Benutzung bei Bedarf sichtbarer Kontamination	Alkoholische Desinfektion. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen. Halbbarkeit nach Anbruch: 2 Monate
	Wannen	Incidin Active	1 %	5 Min.	nach jeder Anwendung bei Bedarf	Wanne entleeren und Reinigung durchführen. Wischdesinfektion der benutzten Flächen + Einwirkzeit einhalten Oberflächen nachspülen mit Wasser nach EWZ
	Fango – Ofen Wärmeofen	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	1 x täglich Bei Bedarf	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen. 1 x pro Tag thermisch die Fangomasse thermisch desinfizieren (130° - 60 Minuten)
	Clostridioides difficile Noroviren Rotaviren	Incidin® Active	2 %	30 Min.	Schlussdesinfektion bei Bedarf	Ansetzen mit kaltem Wasser. Angesetzte Gebrauchslösungen hat eine Standzeit von max.24 Stunden.
erstellt durch:			Freigabe:		Stand:	
© hycom GmbH & Co. KG			Hygienekommission		Bäderabteilung	
			11/2025		11/2025	
					Seite 1 von 1	