



REINIGUNGS-/ DESINFEKTIONSPLAN

HAUTSCHUTZPLAN

Klinik:	HolsingVital Bad Holzhausen		Abteilung: Schwimmbad			
Gegenstand/Maßnahme		Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit	Ausführung
	Hygienische Händedesinfektion	Skinman Soft Protect FF	gebr.-fertig	30 sek.	•VOR: Patientenkontakt, aseptischen Tätigkeiten •NACH: Kontakt mit potentiell infektiösem Material, Patientenkontakt, Kontakt mit der unmittelbaren Patienten Umgebung	Etwa 3–5 ml Desinfektionslösung, bzw. eine Menge, die in eine Hohlhand passt Händedesinfektionsmittel aus dem Spender in die trockenen Hände geben und gleichmäßig bis zu den Handgelenken einreiben. Fingerzwischenräume und Nagelfalz beachten. Gemäß TRBA 250 und RKI ist das Tragen von Schmuck an Händen und Unterarmen nicht gestattet Merke: · Kein Wasser zugeben! · Einwirkzeit beachten!
	Händewaschung	Manisoft	gebr.-fertig	-	bei Verschmutzung nach Toilettengang vor Pausenbeginn	Waschlotion in die angefeuchteten Hände geben, gut mechanisch reinigen. Mit Wasser gründlich abspülen. Anschl. mit Einmal-Handtuch trocknen. Die Verwendung von Stückseifen ist zu verzichten!
	Hautschutz	LINDESA Professional	gebr.-fertig	-	vor Dienstbeginn nach Pausen vor Feuchtarbeiten	Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).
	Hautpflege	LINDESA Professional	gebr.-fertig	-	nach Arbeitsende, ggf. nach Hautreinigung vor Pausen	Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).
	Einmalhandschuhe				Anlegen: -bei Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien -bei der Verwendung von Flächendesinfektionsmitteln usw.	- Vor dem Anlegen und NACH dem Ablegen der Einmalhandschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen. - Passende Größe auswählen - Nach Benutzung entsorgen
	Spender	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	bei Flaschenwechsel	Jeweils neue Behälter für Waschlotion und Händedesinfektionsmittel verwenden. Wischdesinfektion durchführen. Düse mit heißem Wasser durchspülen.
	Behandlungsliege, Inventar	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	Nach Patientenwechsel, nach Benutzung und bei Bedarf + Kontamination	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Flächendesinfektion der Arbeitsflächen	Incidin™ Pro Adenovirus	1,5 % 2,0 %	60 Min. 60 Min.	Nach Kontamination täglicher Unterhaltsreinigung und bei Bedarf	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Vliestuchspendersysteme	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	nach 28 Tagen Standzeit oder bei Bedarf	Aufbereitung nach Herstellerangaben
	Berufskleidung				Wechsel arbeitstäglich bei Kontamination bei Bedarf	Maschinelle Aufbereitung; desinfizierendes/ thermisches Waschverfahren. Keine Privatkleidung (Strickjacken/ langärmelige Kleidung) über und unter der Dienstkleidung tragen. Die Kleidung darf nur zentral aufbereitet werden - nicht zuhause waschen!
	Hilfsmittel: Bälle, Flossen, Ringe etc.	durch Chlorwasser	-	-	bei Einsatz	-
	Schwimmbecken, Badewasser	Reinigungsmittel	-	-	1 x jährlich und bei Bedarf	Kompletter Wasserwechsel und Grundreinigung des Schwimmbades
	Böden	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	Täglich und bei sichtbarer Verschmutzung	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Fliesenwände im Schwimmbad	Reinigungsmittel	-	-	1 x pro Quartal und bei sichtbarer Verschmutzung	Gründliche Reinigung.
	Spindschränke in den Umkleiden	Reinigungsmittel	-	-	1 x monatlich und bei Bedarf	Außen- und Innenflächen reinigen.
	Clostridioides difficile Noroviren Rotaviren	Incidin® Active	2 %	30 Min.	Schlussdesinfektion bei Bedarf	Ansetzen mit kaltem Wasser. Angesetzte Gebrauchslösungen hat eine Standzeit von max.24 Stunden.

erstellt durch:	Freigabe:	Stand:	
© hycom GmbH & Co. KG	Hygienekommission		Schwimmbad
11/2025		11/2025	Seite 1 von 1