

III. Infektionskrankheiten

Dekontaminationsschema bei Patienten mit MRSA-Kolonisation bzw. Infektion

MRSA-Deko

Patientenname:

Geburtsdatum:

Datum:	1 Tag	2 Tag	3 Tag	4 Tag	5 Tag	6 Tag	7 Tag	8 Tag	9 Tag		
Tätigkeit:	Antiseptische Körperwaschung/Antiseptische Mundspülung					Pause	Kontrollabstriche				
Antiseptische Nasensalbe 2 -3 x täglich (lt. Herstellerangaben)	morgens	HZ	morgens	HZ	morgens		HZ	morgens	HZ	morgens	HZ
	mittags	HZ	mittags	HZ	mittags		HZ	mittags	HZ	mittags	HZ
	abends	HZ	abends	HZ	abends		HZ	abends	HZ	abends	HZ
Produktname Nasensalbe:											
Antibakterielle Körperwaschung 1 x täglich	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	
1 x täglich Körper und Haare (ggf. Waschhaube) waschen. Gesamten Körper mit Waschlösung oder vorgefertigte Waschhandschuhe abreiben. Nischen, wie Achseln, Leisten, Schrittbereich, Region um den After, unter der Vorhaut und den Hautfalten unter der Brust oder am Bauch besonders beachten. Einwirkzeit und Konzentration siehe Herstellerangaben.											
Produktname Waschlotion/Waschhandschuh:											
Antibakterielle Mundspüllösung 2 -3 x täglich (lt. Herstellerangaben)	morgens	HZ	morgens	HZ	morgens	HZ	morgens	HZ	morgens	HZ	
	mittags	HZ	mittags	HZ	mittags	HZ	mittags	HZ	mittags	HZ	
	abends	HZ	abends	HZ	abends	HZ	abends	HZ	abends	HZ	
Produktname Mundspüllösung:											
Kleidung und Bettwäsche-wechsel	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	1 x tgl.	HZ	

Abstriche unter MRSA-wirksamer systemischer Antibiose bzw. antibakterieller Waschlotion sind nicht aus-sagekräftig.

Kontroll-abstrich erst einen Tag nach Absetzen der Waschlotion und/oder der Antibiotika-therapie abnehmen.

Tag 1 HZ Tag 2 HZ Tag 3 HZ

Folgende Kontrollabstriche sind immer notwendig:
 -Nase/Rachen (kombiniert)
 - Wunden (falls vorhanden)
 - Leiste*
 + Erst-Nachweisort (z.B. Trachealkanüle, Urin)

- Zahnprothesen: täglich in Antibakterieller Mundspüllösung einlegen und mit Wasser nachspülen
- Brillen und Hörgeräte: wischdesinfizieren
- Pflegeutensilien: Einwegprodukte verwenden. Ansonsten in Instrumentendesinfektionslösung einlegen (Produkt + Einwirkzeit gemäß Desinfektionsplan). Möglichst keine Haarbürsten und Deo-Roller.