

Substanzen, bei denen nach 3 bis 30 Tagen eine Kreatininkontrolle empfohlen wird

Wirkstoffe	Mechanismus, Krankheitsbild	Alternativen
Antibiotika		
Rifampicin	akute interstitielle Nephritis	Rifabutin
Cotrimoxazol	Hemmung der Kreatinin-Sekretion	Gyrasehemmer
Aminoglykoside	tubuläre Proteinsynthese	andere Antibiotika
Penicilline	akute interstitielle Nephritis	andere Antibiotika
Cephalosporine	akute interstitielle Nephritis	andere Antibiotika
Amphotericin B	Tubulotoxizität am Na-Mg-Kanal	Voriconazol, Caspofungin
Antivirale Substanzen		
Foscarnet	Tubulotoxizität	andere Virustatika
Cidofovir	Tubulotoxizität	andere Virustatika
Indinavir	akute interstitielle Nephritis	andere Virustatika
Analgetika		
NSAR	akute interstitielle Nephritis	Paracetamol, Metamizol
Paracetamol	Glutathion-Hemmung	Metamizol
Antihypertensiva		
ACE-Hemmer, AT1-Blocker	Senkung der Nierendurchblutung	andere Antihypertensiva
Lipidsenker		
Statine, Fibrate	tubuläre Obstruktion	eventuell Ezetimib
Immunsuppressiva		
Ciclosporin und Tacrolimus	Vasokonstriktion, interstitielle Fibrose, Vaskulopathie etc.	Mycophenolat, Sirolimus, Everolimus, Prednisolon
Mesalazin	interstitielle Nephritis	Azathioprin, Prednisolon
Diuretika		
Furosemid	immunologische Reaktion	Torasemid
Zytostatika, Zytokine		
Cisplatin, Carboplatin	Tubulotoxizität	andere Zytostatika
Mitomycin	thrombotische Mikroangiopathie	andere Zytostatika
Interferon	Glomerulonephritis	andere Zytostatika
Imatinib	Tubulotoxizität	andere Zytostatika
Naturheilmittel		
Chinesische Kräuter	interstitielle Nephritis (durch Aristolochiasäure verursacht)	weglassen
Psychopharmaka		
Lithium	Diabetes insipidus, interstitielle Nephritis	andere Psychopharmaka